

# AVERTISSEMENTS AGRICOLES



STATION D'AVERTISSEMENTS AGRICOLES

MINISTÈRE DE L'AGRICULTURE  
DIRECTION REGIONALE DE L'AGRICULTURE  
ET DE LA FORÊT  
SERVICE DE LA PROTECTION DES VÉGÉTAUX  
Ancienne Conserverie de CASAMOZZA  
LUCCIANA - 20290 - BORGO

Tél. 95.36.05.70



## EDITION CORSE

Bulletin Technique N° 187  
du 10 Janvier 1991

\* \* \* \* \*  
\* PACE E SALUTE A TUTTI \*  
\* \* \* \* \*

:  
: VIGNE ÷ Bilan Phytosanitaire :  
: - Traitements d'hiver :  
:

Les conditions météorologiques de l'année 1990 ont été semblables à celles de 1989 : des températures minimales particulièrement douces en hiver, Un été chaud et sec. L'hiver a été peu pluvieux, il a fallu attendre les mois d'octobre et novembre pour que des précipitations localement très abondantes puissent avoir lieu.

Cet hiver doux a permis un démarrage précoce de la vigne. Dès la mi-février, on notait les premiers signes de débourrement sur Niellucio.

Dans le domaine phytosanitaire la faiblesse des précipitations printanières n'a entraîné qu'un développement discret des maladies cryptogamiques. Les ravageurs se sont par contre manifestés de bonne heure = acariens jaunes, cicadelles vertes, cochenilles farineuses .... Les tordeuses de la grappe ont été particulièrement agressives en troisième génération sur la plaine orientale. Ce vol fut très abondant et les dégâts spectaculaires pour les vignes n'ayant pas reçu de traitement anti-tordeuses.

La **flavescence dorée** reste stable, pas de nouveau gros foyer, l'**esca** est toujours présent, l'**eutypiose** est localisée à quelques foyers et l'**excoriose** pose rarement des problèmes. Pour ces trois dernières maladies, il est temps de s'en préoccuper.

### ESCA:

Utilisez de l'arsénite de sodium à 1250 g/hl (spécialités commerciales = PYRALESCA, PYRALUMNOL, PYRAL REP)  
Ce produit est **extrêmement dangereux**. Traitez par temps calme et sec, 10 jours après la taille et jusqu'à trois semaines avant le débourrement.

4° 50 43 422

1991 = N° 187 : 1071

Les spécialités à base d'arsenite sont normalement additionnées d'une substance repulsive pour la faune sauvage.

#### :EXCORTOSE:

Utilisez de l'arsenite de sodium à 625 g/hl.

L'arsenite de sodium est également actif sur pyrale de la vigne, formes hivernantes d'insectes et cochenilles.

#### :EUTYPIOSE:

Comme nous vous l'avions signalé précédemment, les mesures prophylactiques restent essentielles = brûler tous les déchets de taille, mastiquer les plaies.

Un traitement chimique préventif l'ATEMICEP peut être appliqué sur les plaies de taille en application au pinceau ou grâce à un sécateur traitant = le CISAR

Il ne faut **absolument pas** pulvériser ce produit.

#### :INSECTES HIVERNANTS:

Les traitements à l'oleoparathion (NS) destinés à lutter contre les acariens, cochenilles, cicadelles de la flavescence dorée (traitement obligatoire en vignes mères) doivent être appliqués en fin d'hiver entre les stades B et C

(C) SERVICE REGIONAL DE LA PROTECTION DES VEGETAUX - 1991 - Toute reproduction même partielle est soumise à notre autorisation.